

ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ ຂອງໜອງໃນແທ້

- (ຜູ້ຊາຍ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕ່ອມລູກໝາກອັກເສບ, ເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວຍາກ, ແກ່ນອັນທະອັກເສບ, ທີ່ສົ່ງອະສຸຈິຕິບຕັນ, ມີລູກຍາກ ແລະ ສາມາດຕິດເຊື້ອ HIV/AIDs ໄດ້.
- (ຜູ້ຍິງ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜັງທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ, ເຈັບທ້ອງຕອນເປັນປະຈຳເດືອນແຮງ, ລຸລູກ ຫຼື ບາງຄົນເຮັດໃຫ້ທໍ່ສົ່ງໄຂ້ຕິບຕັນເຮັດໃຫ້ມີລູກຍາກ, ມີລູກນອກພົກ, ພົກຍ່ຽວອັກເສບ, ສາມາດຕິດໃສ່ລູກໄດ້ ແລະ ສາມາດຕິດເຊື້ອ HIV/AIDs ໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນ

- ບໍ່ຄວນມີຄູ່ຮ່ວມນອນຫຼາຍຄົນ.
- ຄວນປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກວິທີຕາມແພດສັ່ງ.
- ຄວນໃສ່ຖົງຢາງອາໄນໄມທຸກຄັ້ງ ເວລາມີເພດສຳພັນ.



ໝາຍເຫດ: ບາງພະຍາດ ຖົງຢາງອາໄນໄມ ກໍ່ບໍ່
ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ 100 %



ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, HIV/AIDs, ສຸຂະພາບຈິດ



vycentre@yahoo.com



52174490 & 22661218



VWYC Fans



VWYC_Laos



vwyc fans



www.vwyclaos.org

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຮັບຄຳປຶກສາໄດ້ທີ່ ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບໄວໜຸ່ມ



ເປີດບໍລິການທຸກໆມື້ (ວັນຈັນ-ສຸກ)

ເວລາ 8:30-16:30 ໂມງ

ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນມິດ ແລະ ປິດລັບ

ໂທ 021 252887

ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບຕັ້ງຢູ່:

- ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຕິດກັບ ສີ່ແຍກໄຟແດງປາກປ່າສັກ
- ກົງກັນຂ້າມກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ພະຍາດໜອງໃນແທ້ ແມ່ນພະຍາດແນວໃດ?

ສາມາດສົ່ງຂໍຄວາມມາຂໍຮັບຄຳປຶກສາໄດ້ທີ່
ເບີ 020 52174490
020 22661218



ພະຍາດໜອງໃນແທ້

- ພະຍາດໜອງໃນແທ້ ແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈຸລິນຊີ: *Neisseria gonorrhea*. ເຊື້ອດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກີດມີອາການຢູ່ຕາມເຫຍື່ອເມືອກຕ່າງໆ: ປາກ, ຮູຄໍ, ທໍ່ຍ່ຽວ, ປາກມົດລູກ, ມົດລູກ, ທໍ່ສັງໄຂ້, ເຫຍື່ອເມືອກຕາ ແລະ ຮູທະວານ.

ຮູບພາບຂອງພະຍາດໜອງໃນ



ການຕິດຕໍ່ຂອງໜອງໃນແທ້

- ຕິດຕໍ່ໄດ້ຈາກການມີເພດສໍາພັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ, ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນທາງປາກ, ທາງຮູທະວານ, ຊ່ອງຄອດ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດຈາກແມ່ທີ່ມີເຊື້ອ.

ອາການຂອງພະຍາດ

ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດແລ້ວ ຈະມີອາການສະແດງອອກລະຫວ່າງ 2-14 ມື້.

ສໍາລັບເພດຊາຍ
ໜອງຊຸ່ນ ສີຂຽວ, ເຫຼືອງ ຈາກ
ອົງຄະຊາດ, ຍ່ຽວເຈັບ, ຍ່ຽວ
ແສບ, ເຈັບລູກອັນທະ ຫຼື ໄຄ່
ບວມ, ເຈັບຮູທະວານ, ມີນໍ້າ
ໜອງອອກ ຫຼື ມີອາການຄັນ
ແລະ 50% ບໍ່ມີອາການ.



ສໍາລັບເພດຍິງ
ມີອາການລົງຂາວໃນຊ່ອງຄອດ
ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຈັບແສບເວລາຍ່ຽວ,
ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ເລືອດອອກຫຼັງ
ມີເພດສໍາພັນ ແລະ ໃນໄລຍະກາງ
ຮອບປະຈຳເດືອນ, ເຈັບເວລາທີ່ມີ
ເພດສໍາພັນ ແລະ 50% ບໍ່ມີ
ອາການ.

ການບັງມະຕິ

ອີງໃສ່ປັດໄຈສ່ຽງ ການມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ, ອີງໃສ່ອາການທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ອີງໃສ່ຜົນກວດຫາງດ້ານການວິເຄາະເຊັ່ນ:

- ເອົານໍ້າໜອງ ຫຼື ນໍ້າຍ່ຽວມາກວດ.
- Polymerase Chain Reaction (PCR).
- ເອົານໍ້າໜອງ ຫຼື ລົງຂາວໄປຍ້ອມສີກາມສແຕນ ແລ້ວໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດຊ່ອງຫາເຊື້ອພະຍາດ.
- ເອົານໍ້າໜອງ ຫຼື ລົງຂາວໄປປູກຫາເຊື້ອ.

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

- ຄວນເຂົ້າໄປພົບແພດເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ, ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ.
- ບໍ່ຄວນໄປຊື້ຢາມາກິນເອງ.
- ຄວນກິນຢາຕາມແພດສັ່ງໃຫ້ຄົບ.
- ຄວນປິ່ນປົວຄູ່ຮ່ວມນອນນໍາ.
- ບໍ່ຄວນມີເພດສໍາພັນໃນໄລຍະການປິ່ນປົວ.
- ສາມາດກິນອາຫານໄດ້ປົກກະຕິ

