

ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ ພ ຕ ພ

- ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ເປັນ ພຕພ ໂດຍບໍ່ມີການປິ່ນປົວ ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ລາມໄປຫາຄູ່ຮ່ວມນອນ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ແລະ ອາດເປັນຜົນສະທ້ອນໄລຍະຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ.
- ບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວພະຍາດເຊັ່ນ: ຊີຟີລິສ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕາຍໃນທ້ອງ, ໃນໄລຍະຖືພາ 25% (1 ໃນ 4) ຂອງການຖືພາ, ໜຶ່ງໃນເຊື້ອພະຍາດ HVP (ພະຍາດຫອນໄກ່) ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກ.
- ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີໜອງໃນແທ້ ແລະ ທຽມ ທີ່ມີອາການແຊກຊ້ອນເຮັດໃຫ້ອັກເສບຜັງທອງນ້ອຍໃນຜູ້ຍິງ, ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຖືພານອກພົກ ແລະ ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີລູກຍາກອີກດ້ວຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDs.



1361 137

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, HIV/AIDs, ສຸຂະພາບຈິດ

vycentre@yahoo.com 52174490 & 22661218

VWYC Fans

VWYC_Laos

vwyc fans

www.vwyclaos.org

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຮັບຄໍາປຶກສາໄດ້ທີ່
ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບໄວໜຸ່ມ



ເປີດບໍລິການທຸກໆມື້ (ວັນຈັນ-ສຸກ)

ເວລາ 8:30-16:30 ໂມງ

ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນມິດ ແລະ ປິດລັບ

ໂທ 021 252887

ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບຕັ້ງຢູ່:

- ບ້ານສີທອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຕິດກັບ ສີ່ແຍກໄຟແດງປາກປ່າສັກ
- ກົງກັນຂ້າມກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
“ພ ຕ ພ”



ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຂໍຮັບຄໍາປຶກສາໄດ້ທີ່
ເບີ 020 52174490
020 22661218



ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ “ພ ຕ ພ”

- ພ.ຕ.ພ ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດມາຈາກການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພດດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ທາງຊ່ອງຄອດ, ຮູທະວານ ແລະ ປາກ ກັບຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນບາງພະຍາດຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກທາງການສໍາພັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ້ອງກັນກໍຕາມ.
- ພ.ຕ.ພ ມີຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເພດ (ຊະນິດ) ເຊິ່ງອາດແມ່ນເຊື້ອຈຸລິນຊີ, ຈຸລະໂຣກ ແລະ ແມ່ກາຝາກ.
- ພ.ຕ.ພ ທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆຈະມີ: ໜອງໃນແທ້ ແລະ ໜອງໃນທຽມ, ຫອນໄກ່ອະໄວຍະວະເພດ ຍິງ-ຊາຍ, ພະຍາດຕຸ່ມນໍ້າໃສ ແລະ ອື່ນໆ.



ອາການຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ພ ຕ ພ

- ພ.ຕ.ພ ບາງຊະນິດແມ່ນບໍ່ມີອາການສະແດງອອກຫຍັງເລີຍ ແລະ ສາມາດສົ່ງຕໍ່ພະຍາດຫາຄູ່ຮ່ວມນອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ສະນັ້ນ, ຖ້າຄູ່ນອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກບັງມະຕິວ່າເປັນ ພຕພ ທ່ານຕ້ອງມາກວດ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ມີອາການຫຍັງສະແດງອອກ.

ຫຼັງຈາກມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພແລ້ວຫາກວ່າມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄື:

- 1.ມີໜອງຍ້ອຍ ຫຼື ລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ.
- 2.ມີອາການຍ່ຽວເຈັບ - ແສບ.
- 3.ມີອາການຄັນ ຕາມອະໄວຍະວະເພດ.
- 4.ມີຕຸ່ມຂຶ້ນຕາມອະໄວຍະວະເພດ, ປາກ ແລະ ຮູທະວານ (ກໍລະນີມີການຮ່ວມເພດຫຼາຍທາງ).
- 5.ມີບາດແຜຕາມອະໄວຍະວະເພດ.



ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

- ເຂົ້າໄປພົບແພດເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ, ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
- ບໍ່ຄວນໄປຊື້ຢາມາກິນເອງ.
- ກິນຢາຕາມໝໍສັ່ງໃຫ້ຄົບ.
- ປິ່ນປົວຄູ່ຮ່ວມນອນນໍາ.
- ຫຼີກລ້ຽງການມີເພດສໍາພັນ
- ໃນເວລາຊ່ວງປິ່ນປົວ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການແຊກຊ້ອນຕາມມາ.

ວິທີການປ້ອງກັນ

- ບໍ່ຄວນມີຄູ່ຮ່ວມນອນຫຼາຍຄົນ.
- ຄວນປິ່ນປົວໃຫ້ຖືວິທີຕາມແພດສັ່ງ.
- ຄວນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ ເວລາມີເພດສໍາພັນ.

ໝາຍເຫດ: ບາງພະຍາດ ຖົງຢາງອະນາໄມ ກໍບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ 100 %

