

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

- ພະຍາດຕຸ່ມນໍ້າໃສ ແມ່ນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນມີຢາຕ້ານໄວຣັດ ທີ່ສາມາດສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອມັນເປັນເລື້ອຍ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ ແລະ ບາງຂໍ້ມູນລາຍງານວ່າ: ພະຍາດນີ້ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຖ້າກາຍ 2 ປີ ແລ້ວຮ່າງກາຍຈະສາມາດກໍາຈັດມັນໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນ

- ບໍ່ຄວນມີຄູ່ຮ່ວມນອນຫຼາຍຄົນ.
- ຄວນປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກວິທີຕາມແພດສັ່ງ.
- ຄວນໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມທຸກຄັ້ງ ເວລາມີເພດສໍາພັນ.

ໝາຍເຫດ: ບາງພະຍາດ ຖົງຢາງອານາໄມກໍ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ 100 %



ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, HIV/AIDS, ສຸຂະພາບຈິດ

vycentre@yahoo.com 52174490 & 22661218

VWYC Fans VWYC_Laos

vwy fans www.vwyclaos.org

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຮັບຄໍາປຶກສາໄດ້ທີ່ ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບໄວໜຸ່ມ



ເປີດບໍລິການທຸກໆມື້ (ວັນຈັນ-ສຸກ)

ເວລາ 8:30-16:30 ໂມງ

ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນມິດ ແລະ ປິດລັບ

ໂທ 021 252887

ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບຕັ້ງຢູ່:

- ບ້ານສີທອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ຕິດກັບ ສີ່ແຍກໄຟແດງປາກປ່າສັກ
- ກົງກັນຂ້າມກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ພະຍາດຕຸ່ມນໍ້າໃສ ແມ່ນພະຍາດແນວໃດ?



ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຂໍຮັບຄໍາປຶກສາໄດ້ທີ່
ເບີ 020 52174490
020 22661218



ພະຍາດຕຸ່ມນໍ້າໃສ

- ແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຊະນິດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກທີ່ໄວລັດ HSV (Herpes Simplex Virus) ເຊິ່ງເຊື້ອຈຸລະໂລກດັ່ງກ່າວມີຢູ່ 2 ຊະນິດຄື: HSV1 ແລະ HSV2
- HSV1 ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນຜັງປາກ ແລະ ອ້ອມແອ້ມປາກ (ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໄດ້)
- HSV2 ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຍິງ-ຊາຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

- ເມື່ອເຊື້ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແລ້ວ ເຊື້ອຈະມີການແບ່ງຕົວຢູ່ໃນຊັ້ນຂອງຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເກີດມີອາການບວມເປັນຕຸ່ມນໍ້າໃສ ແລະ ເກີດອາການອັກເສບ.
- ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຊື້ອຈະເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປສູ່ປົມກະດັນປະສາດເປັນເວລາດົນນານ ໂດຍບໍ່ມີການແບ່ງຕົວຖ້າຫາກປັດໄຈແວດລ້ອມເໝາະສົມ ເຊື້ອກໍ່ຈະເກີດການແບ່ງຕົວ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເປັນຊໍ້າຄືນ, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນຕຸ່ມນໍ້າໃສຢູ່ທີ່ຮິມປາກ ຈະມີອາການເກີດຊໍ້າປະມານ 20 ຫາ 40% ສ່ວນສໍາລັບຕຸ່ມນໍ້າໃສທີ່ອະໄວຍະວະເພດຈະກັບຄືນມາເປັນອີກ 80%.

ອາການຂອງພະຍາດຕຸ່ມນໍ້າໃສ


ອາການເລີ່ມຕົ້ນຈະມີ ອາການເຈັບ, ແສບ, ຮ້ອນ ບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ ອາການຂອງການຕິດເຊື້ອຢູ່ຜັງປາກ, ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ຮູ ທະວານ, ເຊິ່ງໃນນີ້ມັນຈະມີ 3 ໄລຍະຄື:

1) ໄລຍະການຕິດເຊື້ອຄັ້ງທໍາອິດ (Primary Infection) ເລີ່ມດ້ວຍອາການເຈັບແສບຮ້ອນ, ຕໍ່ມາມີອາການບວມ ແລະ ອີກ 2-3 ມື້ຈະມີຕຸ່ມນໍ້າໃສເກີດເທິງບໍລິເວນພື້ນສີແດງ ຕໍ່ມາຕຸ່ມນໍ້າໃສດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍຈະແຕກພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຕົກເກັດຕາມອາການຮ່ວມເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ເປັນບາດແຜຈະຫາຍດີໃນ 2-3 ອາທິດ.

2) ໄລຍະບໍ່ມີອາການ (Latency and Shedding).

3) ໄລຍະກັບມາເປັນຄືນ (Recurring Infection)

ອາການເຈັບຈະຫຼຸດລົງ ແລ້ວຈະເປັນບໍລິເວນໃກ້ໆ ທີ່ເປັນບ່ອນເກົ່າ, ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະກັບມາເປັນຄືນ 5 ເທື່ອຕໍ່ປີ.



ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາດກັບຄືນມາເປັນອີກ

- ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມຕຶງຄຽດ.
- ອາຫານເຊັ່ນ: ໝາກຖົ່ວ, ກາເຟ, ເຫຼົ້າ, ຊອກໂກແລັດ.
- ການເປັນປະຈໍາເດືອນທີ່ແກ່ຍາວ.
- ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ, ການເຈັບເປັນ.
- ດື່ມເຫຼົ້າ, ດື່ມເບຍ.

ການບົ່ງມະຕິ

ໂດຍທົ່ວໄປ ໃນປະເທດເຮົາເພີ່ມບົ່ງມະຕິອີງຕາມ ອາການບອກເລົ່າຂອງຄົນເຈັບ, ປັດໄຈສ່ຽງ ແລະ ອີງໃສ່ການກວດຮ່າງກາຍຕົວຈິງ ແຕ່ສໍາລັບຢູ່ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ເພີ່ມໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໃໝເຊັ່ນ:

- ການປູກຊອກຫາເຊື້ອໄວລັດ Viral Culture
- ການກວດຫາທາດກາຍຕ້ານ Viral Antigen Test.
- ການກວດ PCR.

