




ຖ້າທ່ານຖືພາໄດ້ 12 ອາທິດ ຫຼື ກາຍນັ້ນ ຕ້ອງໄປສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງຄວນສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19?



ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19
ສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງຖືພາ
ທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງ 22 ເທົ່າ



ຫຼຸດຜ່ອນອາການສະແດງທີ່ຮ້າຍແຮງ,
ການເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ ແລະ ການດູແລຢູ່
ບ່ອນພື້ນຟູຊີບ



ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວທີ່ສຸຂະພາບອ່ອນແອ



ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດກ່ອນກຳນົດ
ແລະ ລູກຕາຍໃນທ້ອງ



ວັກຊີນທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ
ພ້ອມທັງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ

**ຖ້າວ່າທ່ານກຳລັງຖືພາ, ໃຫ້ໄປປຶກສາກັບແພດໝໍ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ
ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19!
ແມ່ປອດໄພ ລູກປອດໄພ!**



ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງທີ່ພວມໃຫ້ນົມລູກຄວນ ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19?



ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ມີພູມຕ້ານທານຢູ່ໃນນ້ຳນົມຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງ
ສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳວ່າແມ່ຍິງຄວນສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວ
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ ພ້ອມທັງຫຼັງຈາກການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ



ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ
ຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່

**ຖ້າວ່າທ່ານກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ, ໃຫ້ໄປປຶກສາກັບແພດໝໍ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ
ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19!
ແມ່ປອດໄພ ລູກປອດໄພ!**